

Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre

Nom	Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	Répartition des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) qui reçoivent un traitement pour l'insuffisance rénale (dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel) selon le mode de traitement à la fin de l'année.
Interprétation	Le nombre de patients selon le mode de traitement donne une idée du fardeau du STIR et du type de traitement utilisé.
Dimension du cadre de PSS	Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens
Nature des besoins	Sans objet
Couverture géographique	Ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis selon le mode de traitement final et le sexe.
Résultats de l'indicateur	Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre, RCITO

Identification de l'indicateur

Nom	Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description et calcul de l'indicateur	
Description	Répartition des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) qui reçoivent un traitement pour l'insuffisance rénale (dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel) selon le mode de traitement à la fin de l'année.
Calcul : description	Les chiffres reposent sur les patients inscrits dans le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes (RCITO) au cours d'une année donnée dans un établissement canadien.
Calcul : affectation géographique	Endroit où les services sont offerts
Calcul : type de mesure	Chiffre - Nombre total de cas
Calcul : ajustement	Aucun
Calcul : méthode d'ajustement	Sans objet
Dénominateur	
	Description : Patients au STIR inscrits dans le RCITO qui, au 31 décembre de l'année civile : <ul style="list-style-type: none"> • sont vivants et en hémodialyse; • sont vivants et en dialyse péritonéale; • vivent avec un greffon rénal fonctionnel
Numérateur	Inclusions : Patients qui ont été inscrits dans le RCITO au cours d'une année civile donnée et qui sont vivants au 31 décembre de cette même année.

Contexte, interprétation et points de référence

Justification	Le suivi du nombre de patients au STIR dans chacun de ces groupes de traitement est important puisqu'il permet de quantifier les coûts de la dialyse et des transplantations rénales, ainsi que le besoin en dons de reins. Chaque forme de traitement pour l'insuffisance rénale est associée à des résultats différents pour les patients et à des coûts différents.
Interprétation	Le nombre de patients selon le mode de traitement donne une idée du fardeau du STIR et du type de traitement utilisé.
Dimension du cadre de PSS	Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens
Nature des besoins	Sans objet
Objectifs et points de référence	Sans objet
Références	Sans objet

Disponibilité des sources de données et résultats

Sources des données	RCITO Type d'année :
Années de données disponibles	Première année de données disponibles : 2008 Dernière année de données disponibles : 2017
Couverture géographique	Ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis selon le mode de traitement final et le sexe.
Mise à jour des résultats	
Fréquence de mise à jour	Chaque année
Résultats de l'indicateur	Outil Web : Statistiques éclair URL : Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre, RCITO
Mises à jour	Sans objet
Énoncé de qualité	Les données du Québec sont exclues en raison d'un taux de sous-déclaration significatif de 2011 à 2017. Les patients traités dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut sont inclus dans les chiffres de l'Alberta; ceux traités au Yukon, dans les chiffres de la Colombie-Britannique; et ceux traités à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les chiffres de la Nouvelle-Écosse. Le RCITO est une base de données longitudinale qui suit les patients au fil du temps. Les centres déclarants peuvent soumettre à tout moment des changements ou des mises à jour aux données d'une année en particulier. Par conséquent, les données peuvent être modifiées et différer de celles publiées dans les rapports précédents.
Mises en garde et limites	Le nombre de patients inscrits dans le RCITO peut différer du nombre réel de patients qui ont reçu des traitements de dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel à la fin de l'année pour les raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none">• certains centres ne déclarent pas tous les nouveaux patients;• certains centres ne déclarent pas tous les décès.
Problèmes relatifs à l'établissement des tendances	Pour plus d'information sur la sous-déclaration dans le RCITO, consultez la Documentation sur la qualité des données à l'intention des utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes, données de 2008 à 2017 . Vous trouverez un aperçu de la sous-déclaration des nouveaux cas de STIR et des décès dans la Documentation sur la qualité des données à l'intention des utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes, données de 2008 à 2017 .
Commentaires	Sans objet