

# Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre

Nom	Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	Répartition des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) qui reçoivent un traitement pour l'insuffisance rénale (dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel) selon le mode de traitement à la fin de l'année.
Interprétation	Le nombre de patients selon le mode de traitement donne une idée du fardeau du STIR et du type de traitement utilisé.
Dimension du cadre de PSS	Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens
Nature des besoins	Sans objet
Couverture géographique	Ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis selon le mode de traitement final et le sexe.
Résultats de l'indicateur	<a href="#">Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre, RCITO</a>
Identification de l'indicateur	
Nom	Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description et calcul de l'indicateur	
Description	Répartition des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) qui reçoivent un traitement pour l'insuffisance rénale (dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel) selon le mode de traitement à la fin de l'année. Les chiffres reposent sur les patients inscrits dans le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes (RCITO) au cours d'une année donnée dans un établissement canadien. Endroit où les services sont offerts Chiffre - Nombre total de cas Aucun Sans objet
Calcul : description	
Calcul : affectation géographique	
Calcul : type de mesure	
Calcul : ajustement	
Calcul : méthode d'ajustement	
Dénominateur	
Numérateur	<b>Description :</b> Patients au STIR inscrits dans le RCITO qui, au 31 décembre de l'année civile : <ul style="list-style-type: none"><li>• sont vivants et en hémodialyse;</li><li>• sont vivants et en dialyse péritonéale;</li><li>• vivent avec un greffon rénal fonctionnel</li></ul> <b>Inclusions :</b> Patients qui ont été inscrits dans le RCITO au cours d'une année civile donnée et qui sont vivants au 31 décembre de cette même année.
Contexte, interprétation et points de référence	Le suivi du nombre de patients au STIR dans chacun de ces groupes de traitement est important puisqu'il permet de quantifier les coûts de la dialyse et des transplantations rénales, ainsi que le besoin en dons de reins. Chaque forme de traitement pour l'insuffisance rénale est associée à des résultats différents pour les patients et à des coûts différents. Le nombre de patients selon le mode de traitement donne une idée du fardeau du STIR et du type de traitement utilisé. Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens Sans objet Sans objet Sans objet
Justification	
Interprétation	
Dimension du cadre de PSS	
Nature des besoins	
Objectifs et points de référence	
Références	
Disponibilité des sources de données et résultats	
Sources des données	RCITO <b>Type d'année :</b>

Années de données disponibles	<b>Première année de données disponibles :</b> 2008
Couverture géographique	<b>Dernière année de données disponibles :</b> 2017
Niveau de déclaration et désagrégation	Ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis selon le mode de traitement final et le sexe.
Mise à jour des résultats Fréquence de mise à jour	Chaque année
Résultats de l'indicateur	<b>Outil Web :</b> Statistiques éclair
Mises à jour Énoncé de qualité	<b>URL :</b> <a href="#">Mode de traitement final des patients au stade terminal de l'insuffisance rénale (STIR) au 31 décembre, RCITO</a> Sans objet
Mises en garde et limites	Les données du Québec sont exclues en raison d'un taux de sous-déclaration significatif de 2011 à 2017.  Les patients traités dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut sont inclus dans les chiffres de l'Alberta; ceux traités au Yukon, dans les chiffres de la Colombie-Britannique; et ceux traités à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les chiffres de la Nouvelle-Écosse.  Le RCITO est une base de données longitudinale qui suit les patients au fil du temps. Les centres déclarants peuvent soumettre à tout moment des changements ou des mises à jour aux données d'une année en particulier. Par conséquent, les données peuvent être modifiées et différer de celles publiées dans les rapports précédents.  Le nombre de patients inscrits dans le RCITO peut différer du nombre réel de patients qui ont reçu des traitements de dialyse ou vivant avec un greffon fonctionnel à la fin de l'année pour les raisons suivantes : • certains centres ne déclarent pas tous les nouveaux patients; • certains centres ne déclarent pas tous les décès.
Problèmes relatifs à l'établissement des tendances	Pour plus d'information sur la sous-déclaration dans le RCITO, consultez la <a href="#">Documentation sur la qualité des données à l'intention des utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes, données de 2008 à 2017</a> .
Commentaires	Vous trouverez un aperçu de la sous-déclaration des nouveaux cas de STIR et des décès dans la <a href="#">Documentation sur la qualité des données à l'intention des utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes, données de 2008 à 2017</a> . Sans objet