

# Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée

Nom	Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée
Nom abrégé ou autre nom	Pourcentage des résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire (transfert et déplacement) s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète
Description	Cet indicateur rend compte du nombre de résidents en soins de longue durée dont la performance dans les transferts et les déplacements s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète. Une augmentation de la dépendance envers les autres pour les transferts et les déplacements peut indiquer une détérioration de l'état de santé général d'un résident.
Interprétation	Un faible résultat est souhaitable, puisqu'il signifie un faible pourcentage de résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire (transfert et déplacement) s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète.
Dimension du cadre de PSS	Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens
Nature des besoins	Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite
Couverture géographique	Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon
Niveau de déclaration et désagrégation	Provincial et territorial, Régional, Établissement, Organisation, Secteur (soins de longue durée en hébergement et en milieu hospitalier)
Résultats de l'indicateur	<a href="#">Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail</a>

## Identification de l'indicateur

Nom	Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée
Nom abrégé ou autre nom	Pourcentage des résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire (transfert et déplacement) s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète

## Description et calcul de l'indicateur

Description	Cet indicateur rend compte du nombre de résidents en soins de longue durée dont la performance dans les transferts et les déplacements s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète. Une augmentation de la dépendance envers les autres pour les transferts et les déplacements peut indiquer une détérioration de l'état de santé général d'un résident.
Calcul : description	Cet indicateur montre le pourcentage des résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire (transfert et déplacement) s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète. On l'obtient en divisant le nombre de résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire s'est détériorée ou maintenue (note maximale) par le nombre total de résidents (à l'exception des résidents en état comateux ou en fin de vie) dont l'évaluation est valide pour la période visée.

Unité d'analyse : résident

Calcul : affectation géographique

Endroit où les services sont offerts

Calcul : type de mesure

Pourcentage ou proportion

Covariables utilisées pour l'ajustement selon les risques:

Calcul : ajustement

Covariables individuelles : dépendance partielle dans les transferts; difficulté à se déplacer; indice de sévérité personnel : sous-ensemble 2 (éléments non diagnostiques); résidents de moins de 65 ans

Stratification à l'échelle de l'établissement : indice des groupes clients (IGC)

Calcul : méthode d'ajustement

Stratification, normalisation directe et indirecte

- Population de référence : 3 000 établissements dans six États américains et 92 établissements de soins en hébergement et hôpitaux de soins de longue durée en Ontario et en Nouvelle-Écosse

### Description :

Résidents dont les évaluations sont valides

### Inclusions :

1. Résidents dont les évaluations sont valides. L'évaluation cible est valide si

a. elle est la dernière évaluation du résident pour le trimestre;

Dénominateur

b. elle a été effectuée plus de 92 jours après la date d'admission;

c. elle n'est pas une évaluation complète à l'admission.

Étant donné qu'il s'agit d'un indicateur de l'incidence, le résident doit également avoir été soumis à une évaluation lors du trimestre précédent, effectuée de 45 à 165 jours avant l'évaluation cible. Si plusieurs évaluations précédentes répondent à ce critère, on choisit la plus récente.

### Exclusions :

1. Résidents en état comateux (B1 = 1), en phase terminale d'une maladie (J5c = 1) ou qui reçoivent des soins palliatifs (P1ao = 1)

**Description :**

Résidents dont la note relative à la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire s'est détériorée à leur évaluation cible (note plus élevée) par rapport à leur évaluation précédente, ou ayant obtenu une note maximale aux deux évaluations

**Inclusions :**

Les variables comprennent les suivantes :

- Transfert – performance (G1bA)
- Marcher dans le corridor – performance (G1dA)
- Déplacement au sein de l'unité – performance (G1eA)

## Numéraire Inclusions

1. Résidents dont les évaluations sont valides. L'évaluation cible est valide si

- a. elle est la dernière évaluation du résident pour le trimestre;
- b. elle a été effectuée plus de 92 jours après la date d'admission;
- c. elle n'est pas une évaluation complète à l'admission.

Étant donné qu'il s'agit d'un indicateur de l'incidence, le résident doit également avoir été soumis à une évaluation lors du trimestre précédent, effectuée de 45 à 165 jours avant l'évaluation cible. Si plusieurs évaluations précédentes répondent à ce critère, on choisit la plus récente.

**Exclusions :**

1. Résidents en état comateux (B1 = 1), en phase terminale d'une maladie (J5c = 1) ou qui reçoivent des soins palliatifs (P1ao = 1)

## Contexte, interprétation et points de référence

Les indicateurs de la qualité du SISLD élaborés par interRAI ([www.interrai.org](http://www.interrai.org)), un réseau international de recherche, fournissent aux organisations des mesures de la qualité dans des domaines clés, comme les fonctions physiques et cognitives, la sécurité et la qualité de vie. Chaque indicateur est ajusté en fonction des caractéristiques du résident qui ne relèvent pas de la qualité des soins, mais peuvent influencer sur le résultat. Les indicateurs peuvent être utilisés par les responsables de la qualité dans le cadre des activités d'amélioration continue. Ils sont également utilisés pour communiquer avec des intervenants clés par l'intermédiaire de bilans et d'ententes de responsabilité.

Un faible résultat est souhaitable, puisqu'il signifie un faible pourcentage de résidents dont la performance dans les AVQ associées à une perte d'autonomie intermédiaire (transfert et déplacement) s'est détériorée ou dont la dépendance à cet égard est demeurée complète.

## Dimension du cadre de PSS Nature des besoins Objectifs et points de référence

Résultats du système de santé : Améliorer l'état de santé des Canadiens

Vivre avec une maladie, une incapacité ou une capacité réduite

Sans objet

Hirdes JP, Mitchell L, Maxwell CJ, White N. [Beyond the "iron lungs of gerontology": Using evidence to shape the future of nursing homes in Canada.](#) *La revue canadienne du vieillissement.* 2011.

Hirdes JP, Poss JW, Caldarelli H, et al. [An evaluation of data quality in Canada's Continuing Care Reporting System \(CCRS\): Secondary analyses of Ontario data submitted between 1996 and 2011.](#) *BMC Medical Informatics and Decision Making.* 2013.

Institut canadien d'information sur la santé. [Vivre dans un centre de soins infirmiers : évaluation de la qualité des centres de soins infirmiers au Canada.](#) 2013.

Jones RN, Hirdes JP, Poss JW, et al. [Adjustment of nursing home quality indicators.](#) *BMC Health Services Research.* 2010.

Qualité des services de santé Ontario. [Bibliothèque des indicateurs de Qualité des services de santé Ontario.](#) Consulté le 4 octobre 2017.

Qualité des services de santé Ontario. [Guide d'analyse comparative des soins de longue durée.](#) 2013.

Qualité des services de santé Ontario. [Results From Health Quality Ontario's Benchmark Setting for Long-Term Care Indicators.](#) 2017.

## Disponibilité des sources de données et résultats

## Sources des données

SISLD

**Type d'année :**

Exercice

## Années de données disponibles

**Première année de données disponibles :**

2010

**Dernière année de données disponibles :**

2018

## Couverture géographique

Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Yukon

Niveau de déclaration et désagrégation Provincial et territorial, Régional, Établissement, Organisation, Secteur (soins de longue durée en hébergement et en milieu hospitalier)

Mise à jour des résultats  
Fréquence de mise à jour Chaque année

Résultats de l'indicateur **Outil Web :**  
Votre système de santé : En détail

**URL :**  
[Accès aux résultats des indicateurs sur Votre système de santé : En détail](#)

Mises à jour Sans objet

Énoncé de qualité

Les utilisateurs doivent interpréter avec prudence les résultats du Système d'information sur les soins de longue durée (SISLD), car à l'heure actuelle, la base de sondage du SISLD ne comprend pas tous les établissements de chaque province et territoire qui composent la population cible du SISLD. Par conséquent, il se peut que la population de référence ne donne pas une image représentative de tous les établissements de soins de longue durée du Canada.

Mises en garde et limites La couverture est incomplète dans les provinces suivantes :

- Manitoba (seuls les établissements de l'Office régional de la santé de Winnipeg sont inclus)
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse

Les indicateurs sont ajustés selon les risques afin de contrôler les facteurs de confusion possibles.

Problèmes relatifs à l'ajout de nouvelles provinces et de nouveaux territoires, il est possible que les différences dans les pratiques liées aux soins influent sur les taux des indicateurs; cependant, les changements à la population sous-jacente seraient contrôlés au moyen de l'ajustement selon les risques. De plus, des données probantes indiquent que l'établissement de tendances et l'utilisation des données de toute la série chronologique ne posent pas de problème et que la qualité des données est constante au fil du temps (Hirdes et al., 2013).

Commentaires On calcule les indicateurs de la qualité du SISLD à l'aide des données de 4 trimestres consécutifs afin de disposer d'un nombre suffisant d'évaluations aux fins de l'ajustement selon les risques. Étant donné que les résidents sont évalués chaque trimestre, un résident peut être compté jusqu'à 4 fois dans l'indicateur.

Les données associées à cet indicateur sont également accessibles dans les Statistiques éclair, qui comprennent les résultats pour les soins de longue durée en hébergement et en milieu hospitalier : <https://www.cihi.ca/fr/statistiques-eclair>.